

# AGACID 5+



**Desinfektionsmittel auf Basis  
von Peressigsäure.  
DVG bestätigte Wirksamkeit  
bei behüllten Viren bis -10°C.  
DVG bestätigte Wirksamkeit  
gegen Kokzidien und  
Kryptosporidien mit 2%**



# AGACID 5+

## EIGENSCHAFTEN

- Hochstabilisiertes, schäumendes und schnell wirkendes FiBL gelistetes Desinfektionsmittel
- Enthält 5% Peressigsäure und 25% Wasserstoffperoxid
- Bakterizide, viruzide und levurizide Wirksamkeit
- Kann bei behüllten Viren (z.B. AI) ab -10°C<sup>1)</sup> und mit herkömmlichen Wasserhärten optimal eingesetzt werden.
- Ein ausgezeichneter Tiefeneffekt bei geringer Geruchsbelastung ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungsbereichen.



## Desinfektion von Oberflächen & Geräten

Reinigen Sie zunächst die zu desinfizierenden Oberflächen & Geräte.  
Bereiten Sie eine AGACID 5+ Lösung vor:

|                        | DVG Anwendungsempfehlung        | DVG                                                                                           | EN TESTS               |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bakterizid             | 4b, vorbeugende Desinfektion:   | 10°C / 30 Min. / 0,5%<br>20°C / 30 Min. / 0,5%                                                | 0,4% / ≥ 5 Min. / 10°C |
|                        | 4a, spezielle Desinfektion:     | 4°C / 30 Min. / 1,5%<br>10°C / 60 Min. / 1%<br>20°C / 30 Min. / 1%                            |                        |
| Levurozid              | Hefepilze, 6a, (Levurizidie):   | 4°C / 30 Min. / 2 %<br>10°C / 60 Min. / 2%                                                    | 0,6% / ≥ 5 Min. / 10°C |
| Viruzid                | 7a, unbehüllte Viren:           | 10°C oder 20°C / 30 Min. / 1,5%                                                               | 1,25 / ≥ 5 Min. / 10°C |
|                        | 7b, behüllte Viren:             | -10°C / 30 Min. / 1,5% <sup>1)</sup><br>4°C / 30 Min. / 1%<br>10°C oder 20°C / 30 Min. / 0,5% |                        |
| Antiparasitäre Wirkung | 8b, Kokzidien & Kryptosporidien | 20°C / 120 Min. / 2%                                                                          |                        |

<sup>1)</sup> Anwendung bei -10°C: Zumischung zu einer vorgelegten 25%igen Ethylenglykol-Wasser-Mischung.

- **Sprühen oder schäumen** Sie die verdünnte Lösung bei niedrigem Druck mit einer Rate von 400 ml/m<sup>2</sup> bis zur Ablaufgrenze. Lassen Sie die Lösung je nach Anforderung einwirken.
- **Dippen** Sie die Geräte in die verdünnte Lösung. Je nach Anforderung einwirken lassen.

### BAKTERIZIDE WIRKSAMKEIT

**EN 14349 / 0,4% / ≥ 5 Min. / 10°C / 3g/l BSA**

(*Staphylococcus aureus*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*)

### LEVUROZIDE WIRKSAMKEIT

**EN 16438 / 0,6% / ≥ 5 Min. / 10°C / 3g/L BSA**  
(*Candida albicans*)

### VIRUZIDE WIRKSAMKEIT

**EN 14675 / 1,25% / ≥ 5 Min. / 10°C / 3g/l BSA**  
(*Bovine Enterovirus type 1 (ECBO)*)

Wirkstoffe:

pH -Wert bei 10 g/l:

Lagerung:

Haltbarkeit:

Peressigsäure

3±0,5

An einem sauberen, kühlen, gut gelüfteten Ort, nicht in der Nähe von Hitze- und intensiven Lichtquellen aufbewahren

12 Monate nach Herstellungsdatum

From Farm to Fork

**kersia**

Wirksam gegen  
**Kokzidien &  
Kryptosporidien**  
durch die DVG bestätigt  
(2%, 120 Min., 20°C)

